

Matrices - Formes quadratiques - Fonctions de plusieurs variables

EN2D2

Thierry Sageaux, Lycée Gustave Eiffel.

DIAGONALISATION : Tout le chapitre.FORMES QUADRATIQUES : Formes bilinéaires, formes quadratiques, aspect matriciel, rang, signature, formes dégénérées, non dégénérées, définies, non définies, semi-définies, non semi-définies. Décomposition de Gauss (forme réduite).FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES : Ecrire un développement à l'ordre 2 d'une fonction de 2 variables. Continuité, dérivabilité, différentiabilité.**Exercices préparatoires :****Exercice 1.**

Déterminer les rangs et signatures des formes quadratiques suivantes. Dire si elles sont dégénérées ou pas, définies ou pas, semi-définies ou pas, positives ou pas, négatives ou pas, bleues ou pas.

$$\begin{array}{ll} \mathbf{1)} & q(x, y, z) = 2x^2 - 2y^2 - 6z^2 + 3xy - 4xz + 7yz, \\ \mathbf{2)} & q(x, y, z, t) = xy + yz + zt + tx, \end{array} \quad \mathbf{3)} \quad q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i x_j.$$

Exercice 2.

Déterminer la forme réduite de $q(x, y) = 6x^2 + 4xy + 9y^2$ dans une base orthonormée.

Exercice 3.

Soit q une forme quadratique et f sa forme polaire sur un espace vectoriel E de dimension finie. On suppose que f n'est ni dégénérée, ni semi-définie. Montrer que q n'est pas de signe constant.



Solutions des exercices

Exercice 1.

1) Via la matrice associée, on trouve trois valeurs propres distinctes : 0 et les racines de $X^2 + 6X - \frac{45}{2}$ qui sont de signe différent, d'où la signature $\text{sgn}(q) = (1, 1)$, $\text{rg}(q) = 2$. Dégénérée, non définie, non semi-définie et un peu bleue quand même.

2) On trouve $q(x, y, z, t) = \frac{1}{4}(x + y + z + t)^2 - \frac{1}{4}(x - y + z - t)^2$. Les deux formes linéaires sont indépendantes, donc $\text{sgn}(q) = (1, 1)$ et $\text{rg}(q) = 2$. Idem que la précédente.

3) On a $q(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + \dots + x_n)^2$, d'où la signature $\text{sgn}(q) = (1, 0)$ et le rang vaut $\text{rg}(q) = 1$. Même conclusion.

Exercice 2.

On trouve 5 et 10 pour valeurs propres et pour vecteurs propres associés $e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1)$ et $e_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)$. D'où la forme réduite $q(X, Y) = 5X^2 + 10Y^2$ dans cette nouvelle base.

Exercice 3.

Si $\dim(E) = n$ est finie, alors on a la signature $\text{sgn}(q) = (a, b)$ avec $a + b < n$, $a \neq 0$ et $b \neq 0$. Donc il existe une valeur propre strictement positive et une valeur propre strictement négative. Il existe donc des vecteurs propres dont les images sont de signe différent.

